

## ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE O papel da Autoridade de Saúde na avaliação de riscos para a saúde

António Tavares<sup>1</sup> & Helena Rebelo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Médico de Saúde Pública (PhD, MD), Delegado de Saúde Regional, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Av. Estados Unidos da América Nº 75 – 6º piso, 1749-096 Lisboa, Portugal, [antonio.tavares@arslvT.min-saude.pt](mailto:antonio.tavares@arslvT.min-saude.pt)

<sup>2</sup> Farmacêutica (MSc), Coordenadora do Departamento de Saúde Ambiental e da Unidade de Água e Solo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Av. Padre Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal, [helena.rebelo@insa.min-saude.pt](mailto:helena.rebelo@insa.min-saude.pt)

### RESUMO

Pretende-se nesta comunicação destacar o papel dos serviços de saúde, em particular da Autoridade de Saúde, na identificação, avaliação, gestão e comunicação de riscos para a saúde associados ao consumo de águas minerais naturais e de nascente engarrafadas, bem como à utilização de águas minerais naturais em estabelecimentos termais, tendo como base as competências atribuídas em legislação específica e sectorial.

### Palavras Chave

Autoridade de Saúde, Vigilância Sanitária, Riscos para a saúde, Termalismo, Águas Minerais Naturais

### 1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL


Os **Serviços de Saúde Pública**, integrando o exercício do poder de **Autoridade de Saúde**, enquanto obrigação do Estado de intervir atempadamente na defesa da saúde pública, desempenham um papel fundamental na prevenção da doença e na promoção e protecção da saúde, bem como no controlo dos factores de risco e controle de situações susceptíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou das populações (*DECRETO-LEI nº 81/2009, de 2 de Abril; DECRETO-LEI nº 82/2009, de 2 de Abril*).

O quadro legislativo em vigor refere também que, uma vez que os serviços de saúde pública interessam a todos os sectores económicos e agentes sociais, são naturalmente elementos catalisadores de parcerias e estratégias intersectoriais que asseguram a participação colectiva no processo de defesa e promoção da saúde (*DECRETO-LEI nº 81/2009, de 2 de Abril*).

A prevenção e o controlo de **riscos para a saúde**, através do desenvolvimento de medidas correctivas, preventivas, legislativas, educativas ou outras, exigem a monitorização de variáveis com reconhecidos efeitos na Saúde Pública, tendo em vista descrever, avaliar e interpretar as observações e medições realizadas, com propósitos definidos (*COREY, 1988*). Estes propósitos abrangem o fornecimento da informação recolhida a todos os que dela necessitam (*TYLER et al, 1998*), incluindo as autoridades, os profissionais de saúde, os agentes económicos e o público em geral.

Os programas de **vigilância epidemiológica ambiental** interrelacionam-se com os programas de prevenção e controlo de doenças relativas ao ambiente. Apresentam-se esquematicamente na Figura 1 as interacções entre as suas diversas componentes. É aí evidente o ciclo subjacente à noção de vigilância, enquanto liga monitorização sistemática e disseminação adequada da informação gerada com a actuação em saúde, enquanto aponta explicitamente

para a necessária continuidade no sentido do controlo efectivo do problema em questão (COREY, 1988; TYLER, 1998; MIGUEL *et al.*, 2001; CALHEIROS, 2002).



**Figura 1** – Componentes dum programa de vigilância epidemiológica ambiental e suas interações com programas de prevenção e controlo de doenças relativas ao ambiente (Adaptado de CALHEIROS, 2002)

Em suma, a vigilância epidemiológica ambiental corresponde a um processo sistemático de observação e medição de variáveis com reconhecidos efeitos na Saúde Pública que inclui monitorização ambiental, biológica e epidemiológica.

A monitorização biológica e epidemiológica é muitas vezes inexistente ou de difícil interpretação devido a dificuldades relativas à utilização de indicadores biológicos de exposição e à recolha e tratamento de dados epidemiológicos, o que restringe largamente a sua utilização na avaliação de riscos para a saúde. Por este motivo, esta avaliação é maioritariamente efectuada com base na vertente ambiental, ou seja, no caso concreto das águas minerais naturais e de nascente, com base na informação relativa à qualidade da água e condições técnico-sanitárias das respectivas explorações.

Isto significa dizer que, para o exercício das suas competências em matéria de gestão e comunicação de riscos para a saúde, as Autoridades de Saúde necessitam de **apoio laboratorial, tecnológico e epidemiológico**, enquanto instrumentos que fundamentam e enquadram a sua actuação.

## 2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Pela sua diversidade geológica, Portugal é muito rico em águas minerais naturais, muitas das quais utilizadas em instalações termais pelas suas propriedades terapêuticas conhecidas desde longa data, muitas das vezes de forma empírica.

A hidrodiversidade natural destas águas assenta fundamentalmente na sua composição química, temperatura e gases dissolvidos. Os domínios terapêuticos das águas englobam

propriedades tão diversas como as diuréticas e purificantes, dermatológicas, digestivas, anti-alérgicas, anti-hipertensoras, anti-inflamatórias, entre outras.

As actividades de reconhecimento, exploração e utilização de águas minerais naturais e de nascente encontram-se perfeitamente regulamentadas.

Os **diplomas legais** em vigor com implicações directas na avaliação e controlo de riscos para a saúde relacionados com a exploração e utilização dos recursos hidrominerais são os seguintes:

- Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto – regulamenta a qualidade da água para consumo humano a que deve também obedecer, do ponto de vista físico-químico, a qualidade das águas de nascente;
- Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho – regulamenta o licenciamento, organização, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos termais;
- Decreto-Lei nº 72/2004, de 25 de Março – estabelece a lista, os limites de concentração e as menções constantes do rótulo para os constituintes das águas minerais naturais, bem como as condições de utilização de ar enriquecido em ozono para o tratamento das águas minerais naturais e de nascente;
- Portaria nº 1220/2000, de 29 de Dezembro – define as condições a que as águas minerais naturais e de nascente, na captação e nos estabelecimentos termais, devem obedecer para serem consideradas bacteriologicamente próprias;
- Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho – define e caracteriza as águas minerais naturais e de nascente e estabelece regras relativas à sua exploração, acondicionamento e comercialização;
- Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de Março – regulamenta o aproveitamento das águas minerais naturais;
- Decreto-Lei nº 90/90, de 16 de Março – disciplina o regime jurídico de revelação e aproveitamento de recursos geológicos, integrados ou não no domínio público;
- Decreto-Lei nº 84/90, de 16 de Março - regulamenta o aproveitamento das águas de nascente.

No âmbito das **competências** específicas dos serviços de saúde, atribuídas ao **delegado de saúde** pelo Decreto-Lei nº 142/2004, em matéria de prevenção de riscos para a saúde associados à utilização de águas minerais naturais em estabelecimentos termais, destacam-se os seguintes:

- efectuar as vistorias necessárias ao processo de licenciamento ou alteração do funcionamento do estabelecimento termal, nomeadamente pela introdução de novos serviços termais ou de novas tipologias de tratamentos abrangidos;
- fazer cumprir pelos estabelecimentos termais as normas que tenham por objecto a defesa da saúde pública através da avaliação e promoção da qualidade técnica, assistencial e humana dos cuidados e tratamentos prestados;
- verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos para o funcionamento dos estabelecimentos termais;
- avaliar a implementação dos programas de controlo de qualidade;
- propor as medidas correctivas consideradas necessárias face às deficiências encontradas;
- verificar as condições de funcionamento dos equipamentos existentes;
- fazer a avaliação da qualidade da água no âmbito da vigilância sanitária;

- participar ao delegado de saúde regional as infracções que constituam contra-ordenações, com vista à aplicação das coimas previstas na lei.

No caso das águas minerais naturais e de nascente engarrafadas, de acordo com o Decreto-Lei nº 156/98, compete à Autoridade de Saúde efectuar a sua vigilância periódica nas fases de exploração, engarrafamento e comercialização.

### 3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DISCUSSÃO

Para identificação, avaliação e controlo de riscos de natureza ambiental susceptíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou das populações, os Serviços de Saúde Pública elaboram e desenvolvem **programas de vigilância sanitária**, sendo esta entendida como um conjunto de acções de fiscalização e monitorização, de carácter periódico, sob a responsabilidade das Autoridades de Saúde, destinadas a localizar, identificar e procurar evitar, anular ou corrigir riscos para a saúde humana devidos à utilização, neste caso, dos Estabelecimentos Termais.

A vigilância sanitária tem em linha de conta quatro vertentes: higio-sanitária, tecnológica, analítica e epidemiológica.

A **vertente higio-sanitária** refere-se a acções de avaliação das condições e procedimentos de higiene e segurança a nível das instalações e do funcionamento dos estabelecimentos termais.

A **vertente tecnológica** é da competência dos serviços de engenharia sanitária e compreende a vistoria aos requisitos técnicos exigidos a nível de instalações e equipamentos, nomeadamente nos sistemas de adução, armazenamento, distribuição, engarrafamento ou utilização.

A **vertente analítica**, ao cuidado dos laboratórios de saúde pública ou do INSA, inclui a monitorização analítica da qualidade das águas, através da colheita de amostras de água para a realização de análises que complementem as realizadas no âmbito do programa de controlo realizado sob a responsabilidade do concessionário. Esta monitorização é efectuada, no caso das águas minerais naturais e de nascente acondicionadas, no produto final e, no caso das águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, no ponto de utilização.

A **vertente epidemiológica** compete ao médico de saúde pública e consiste, no caso das águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, na avaliação dos dados de saúde constantes do Relatório clínico enviado anualmente ao delegado de saúde regional pelo titular do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004), dados relativos a situações de doença ocorridas em estabelecimentos termais (de notificação obrigatória ou outras) e ainda dados recolhidos no âmbito das acções de inspecção e vistoria levadas a efeito pelos serviços de saúde. Contudo, na maior parte dos casos, a monitorização epidemiológica é inexistente ou de difícil interpretação devido a dificuldades relativas à recolha e tratamento de dados epidemiológicos, o que restringe largamente a sua utilização na avaliação de riscos para a saúde.

No **planeamento da vigilância sanitária** é avaliado o histórico de cada estabelecimento termal e ponderada a natureza do risco para a saúde associada ao consumo / utilização das águas minerais naturais e de nascente. Não existe, por isso, um programa único de vigilância sanitária com aplicação generalizada a todos os estabelecimentos termais ou instalações de engarrafamento. Os programas de vigilância sanitária deverão ter em conta as especificidades de cada estabelecimento termal ou instalação de engarrafamento no que concerne a pontos críticos detectados. Por exemplo, o número e abrangência das vistorias efectuadas depende da

persistência e gravidade de anomalias anteriormente registadas, tal como a qualidade bacteriológica e físico-química das águas condicionará a sua monitorização analítica.

Assim, os programas de vigilância sanitária a desenvolver, durante a época termal, têm como **objectivos**:

- prevenir as doenças transmitidas pelas águas minerais naturais, através da ingestão, inalação ou contacto dérmico;
- actualizar o diagnóstico da situação no domínio deste tipo de águas, identificando potenciais riscos para a saúde;
- promover a vigilância da qualidade das águas minerais naturais nos estabelecimentos termais.

No que se refere à **análise bacteriológica**, esta inclui a determinação de germes totais a 22°C e 37°C, coliformes totais, *Escherichia coli*, enterococos, *Clostridium perfringens* e *Pseudomonas aeruginosa*. É também efectuada a determinação de *Legionella pneumophila* e *Legionella spp.* (outras espécies de *Legionella*).

Os germes totais a 22°C representam o microbismo natural de uma água enquanto os germes totais a 37°C incluem sobretudo bactérias que se desenvolvem no ser humano e nos animais. (MENDES *et al*, 2004; WHO, 2004).

A *Escherichia coli*, os enterococos e os esporos da espécie *Clostridium perfringens* são os principais microrganismos indicadores de contaminação fecal. Estes microrganismos, não patogénicos ou de patogenicidade muito limitada, têm origem fecal, tal como a maioria dos microrganismos patogénicos encontrados nas águas, e existem nas fezes em maior número que os microrganismos patogénicos. Por este motivo são utilizados como indicadores de contaminação fecal, uma vez que é particularmente difícil isolar e identificar todos os possíveis microrganismos patogénicos de origem fecal.

Os coliformes totais constituem um grupo heterogéneo de enterobactérias, pertencentes aos géneros *Escherichia*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Citrobacter*, *Aerobacter* e outras, que inclui bactérias de origem fecal e bactérias do ambiente. A sua determinação em conjunto com a determinação de *E. coli*, em águas naturais, permite avaliar a extensão da contaminação fecal relativamente à contaminação total (fecal e ambiental). A espécie *C. perfringens* está normalmente presente nas fezes embora em menor número que a *E.coli*. Os seus esporos podem persistir nas águas bastante mais tempo que os restantes indicadores de contaminação fecal. Por este motivo, a sua presença em águas naturais é indicadora da eventual presença de microrganismos patogénicos igualmente resistentes, como é o caso dos enterovírus, do *Cryptosporidium*, da *Giardia*, de amibas e de outros parasitas. Devido à sua longevidade eles poderão ser indicadores de uma contaminação intermitente ou à distância, no tempo e no espaço (WHO, 2004).

A *Pseudomonas aeruginosa* é uma bactéria oportunista que se encontra largamente difundida no ambiente e que se caracteriza por apenas revelar patogenicidade em indivíduos cujos mecanismos de defesa são deficientes (imunodeprimidos, lactentes, crianças, idosos),

As bactérias do género *Legionella* encontram-se em ambientes aquáticos naturais e também em sistemas artificiais, como sistemas de distribuição de água e sistemas de ar condicionado e de arrefecimento (torres de refrigeração, condensadores evaporativos e humidificadores). Surgem ainda em fontes ornamentais e tanques recreativos. São conhecidas cerca de 47 espécies de *Legionella*, sendo a *Legionella pneumophila* reconhecida como a mais patogénica. A exposição a esta bactéria pode provocar uma infecção respiratória, actualmente conhecida por Doença dos Legionários. Esta infecção transmite-se por inalação de aerossóis de água contaminada. A ingestão da bactéria não provoca infecção, nem se verifica o contágio pessoa a

peessoa. Determinados factores ambientais, tais como temperatura da água entre 20°C e 45°C, humidade relativa superior a 60%, reduzida circulação de água, processos de corrosão ou incrustação, existência de biofilme nas superfícies em contacto com a água, favorecem o desenvolvimento desta bactéria.

A **análise físico-química** inclui habitualmente as determinações de turvação, pH, condutividade eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade.

Uma água que apresente valores de turvação alterados é normalmente encarada como suspeita de constituir risco para a saúde. Contudo, não existe uma relação directa e inequívoca entre a turvação da água e a existência de risco sanitário. Numerosos constituintes poderão provocar alterações organolépticas, podendo incluir substâncias com interesse toxicológico ou não. A turvação é devida à presença de partículas em suspensão, tais como limo, argilas, grãos de areia, colóides, plâncton, matéria orgânica ou ferro oxidado. Águas com contaminação microbiológica podem apresentar turvação. (MENDES *et al*, 2004; WHO, 2004).

O pH constitui a expressão da acidez ou da alcalinidade de uma água e depende da sua composição, sendo os teores em dióxido de carbono, bicarbonatos e carbonatos os principais componentes que condicionam o valor do pH.

A condutividade eléctrica mede a corrente eléctrica conduzida pelos iões presentes na água, sendo usada como medida da sua mineralização

Quanto aos compostos inorgânicos azotados, o ião nitrato (NO<sub>3</sub>) é o contaminante mais comumente encontrado nas águas subterrâneas. A sua presença em elevadas concentrações tem aumentado progressivamente nos últimos anos, em consequência das práticas agrícolas e da descarga de esgotos na superfície dos solos. Os fertilizantes minerais são a principal fonte de nitrato existente nas águas subterrâneas. O nitrato pode ter também origem nos esgotos e resíduos de plantas através do processo oxidativo que transforma a matéria orgânica, sucessivamente, em amónia, nitritos e nitratos. Os nitratos são muito solúveis na água e representam a forma mais estável de azoto inorgânico (forma oxidada), razão pela qual aparecem em ambientes fortemente oxidantes como é o caso das águas subterrâneas pouco profundas, em sedimentos de alta permeabilidade e em rochas fracturadas que possuem elevados teores de oxigénio gasoso dissolvido. O azoto pode também aparecer na forma de ião amónio (NH<sub>4</sub>), nitrito (NO<sub>2</sub>) ou como azoto orgânico (N). As diferentes formas de azoto podem, assim, interconverter-se em função das características de oxi-redução do meio ambiente. Nas águas minerais naturais, pela sua origem profunda e obrigatoriedade de implementação de perímetros de protecção das captações, é de todo improvável a presença de nitratos nestas águas. Contudo, dado o ambiente redutor onde têm origem, é comum possuírem teores apreciáveis de amónia (forma reduzida de azoto) (WHO, 2004; MENDES *et al*, 2004).

O risco para a saúde associado aos compostos azotados deve-se à toxicidade dos nitratos e nitritos. Os nitratos, por si só, apresentam baixa toxicidade. É a sua redução endógena a nitritos, principalmente na saliva, no estômago e no intestino, que representa risco para a saúde devido ao papel deste ião na formação de metahemoglobina e de nitrosaminas. A metahemoglobina constitui uma forma anormal de hemoglobina incapaz de transportar o oxigénio, sendo responsável por situações de cianose, hipóxia, debilidade e taquicardia. A presença anormal de metahemoglobina pode dever-se a uma deficiência enzimática ou à acção de agentes oxidantes (nitritos). Os lactentes são os mais sensíveis a este efeito por não terem ainda os sistemas enzimáticos completamente desenvolvidos, embora estejam também descritos casos entre a população adulta. As nitrosaminas resultam da reacção entre nitritos e aminas que podem existir nos alimentos (aminoácidos das proteínas) e em alguns medicamentos e têm propriedades carcinogénicas (MENDES *et al*, 2004; WHO, 2004; GRAY,

1996), sendo responsáveis designadamente por carcinomas gástricos (ROBBINS & COTRAN, 2005).

A oxidabilidade em meio ácido constitui um indicador do estado higiénico de uma água, pois avalia o teor de matérias orgânicas ou inorgânicas oxidáveis nas condições do ensaio (RODIER, 1996).

A **periodicidade das colheitas** para análise bacteriológica e físico-química depende da natureza do risco para a saúde associada ao consumo / utilização das águas minerais naturais e de nascente.

A contaminação bacteriológica está habitualmente associada a efeitos agudos, sendo o risco ocasional, o que obriga a uma maior vigilância da qualidade da água.

Ao invés, a contaminação química está geralmente associada a riscos a médio ou longo prazo, ou seja, riscos devidos ao consumo regular e contínuo, durante meses ou anos, de uma água quimicamente contaminada.

Por estes motivos, as colheitas para análise bacteriológica devem ser efectuadas com maior frequência do que para análise físico-química.

### 3.1. Vigilância sanitária em estabelecimentos termais

Imediatamente **antes da abertura** do estabelecimento termal é efectuada uma vistoria às instalações para verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos para o funcionamento do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004), bem como para verificar as condições higio-sanitárias de instalações e equipamentos e a implementação dos programas de controlo de qualidade da água. Em caso de anomalias são propostas as medidas correctivas consideradas necessárias face às deficiências encontradas. O número de vistorias ao longo do período de funcionamento do estabelecimento termal depende do histórico relativamente à persistência e gravidade de anomalias registadas.

Também nas semanas imediatamente anteriores à abertura do estabelecimento termal é habitual efectuar pelo menos 3 análises bacteriológicas, com o intervalo de uma semana, à água mineral natural, num ponto aleatoriamente definido de cada tipo de equipamento e por sector onde a mesma é utilizada. Esta análise inclui a determinação de germes totais a 22°C e 37°C, coliformes totais, *Escherichia coli*, enterococos, *Clostridium perfringens* e *Pseudomonas aeruginosa*. É também efectuada a determinação de *Legionella pneumophila* e *Legionella spp.* (outras espécies de *Legionella*) nos mesmos pontos, com excepção da buvete.

A monitorização da qualidade da água **durante o período de funcionamento** do estabelecimento termal depende, tal como já foi referido, dos resultados obtidos anteriormente. Em termos gerais, é habitual manter a realização das análises bacteriológicas com uma periodicidade mensal. A pesquisa de *Legionella pneumophila* e *Legionella spp.* é repetida a meio da época termal, em pontos diferentes dos que anteriormente foram sujeitos a controlo.

A interpretação dos **resultados bacteriológicos** obtidos é efectuada com base nos valores paramétricos definidos na Portaria nº 1220/2000, de 29 de Dezembro (Quadro 1).

**Quadro 1.** Condições a que as águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais devem obedecer para serem consideradas bacteriologicamente próprias (Portaria nº 1220/2000, de 29/12)

Parâmetro analítico	Valor paramétrico (AMN utilizada para ingestão e contacto com as mucosas respiratórias, oculares e outras mucosas internas)	Valor paramétrico (AMN utilizada para banhos e duches)
Germes totais a 37°C às 24 H	5 ufc / 1 mL de amostra	20 ufc / 1 mL de amostra
Germes totais a 20-22°C às 72 H	20 ufc / 1 mL de amostra	100 ufc / 1 mL de amostra
Coliformes totais	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Escherichia coli</i> ,	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
Enterococos	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Clostridium perfringens</i>	0 ufc / 50 mL de amostra	0 ufc / 50 mL de amostra
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Legionella pneumophila</i>	0 ufc / 1L de amostra	0 ufc / 1L de amostra
<i>Legionella spp.</i>	100 ufc / 1L de amostra	100 ufc / 1L de amostra

Durante as 3 semanas em que decorrem as análises bacteriológicas é também efectuada uma **análise físico-química** à água mineral natural, habitualmente em 3 pontos de utilização aleatoriamente definidos. Esta análise inclui as determinações de turvação, pH, condutividade eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade. A repetição da análise durante a época termal depende do histórico.

Com excepção dos nitratos e nitritos não estão definidos valores paramétricos para os restantes parâmetros efectuados. Os teores máximos de nitratos e nitritos estão definidos no Decreto-Lei nº 72/2004 para as águas minerais naturais e são de 50 mg/L e 0,1 mg/L, respectivamente. Relativamente aos resultados obtidos para os restantes parâmetros, consideram-se que estão adequados se não exibirem alterações significativas ao longo do tempo.

As águas minerais naturais são águas de circulação subterrânea profunda, consideradas bacteriologicamente próprias e com características físico-químicas estáveis na origem, dentro da gama de flutuações naturais. São sistemas aquosos impolutos cuja composição química é de origem natural e proveniente exclusivamente de fenómenos de interacção água/rocha. Por tal facto, esta composição química é específica, não existindo duas águas iguais, e define um padrão químico próprio que não sofre modificações significativas ao longo do tempo. Por este motivo, toda e qualquer alteração no perfil físico-químico destas águas é indicador de alteração de qualidade cuja origem e efeitos na saúde importa esclarecer e corrigir.

### 3.2. Vigilância sanitária aplicada às águas minerais naturais e de nascente engarrafadas

As instalações de engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente são alvo de vistorias cuja periodicidade depende do histórico, relativamente à persistência e gravidade de



anomalias registadas. Os estabelecimentos que revelem com alguma frequência a ocorrência de anomalias serão alvo de uma maior vigilância.

No que se refere à avaliação da qualidade destas águas, é feita a sua monitorização no produto final com uma periodicidade que depende também do histórico disponível.

O protocolo analítico inclui a **análise bacteriológica**, com a determinação de germes totais a 22°C e 37°C, coliformes totais, *Escherichia coli*, enterococos, *Clostridium perfringens* e *Pseudomonas aeruginosa* e a **análise físico-química** com a determinação da turvação, pH, condutividade eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade.

A interpretação dos resultados bacteriológicos obtidos para as **águas minerais naturais** é efectuada com base nos valores paramétricos definidos na Portaria 1220/2000, de 29 de Dezembro e no Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho (Quadro 2).

A interpretação dos resultados bacteriológicos e físico-químicos obtidos para as **águas de nascente** é efectuada com base nos valores paramétricos definidos no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto (Quadro 3).

Após engarrafamento, a determinação dos germes totais a 22°C e 37°C, para além da informação que fornece sobre a qualidade microbiológica das águas, permite também detectar eventuais fraudes a nível da utilização de tratamentos não autorizados. Com efeito, a ausência do microbismo natural da água, avaliado pelo valor dos germes totais, em particular a 22°C, permite suspeitar da utilização de desinfectantes ou adição de bacteriostáticos.

**Quadro 2.** Condições a que as águas minerais naturais devem obedecer para serem consideradas bacteriologicamente próprias (Portaria 1220/2000, de 29/12 e Decreto-Lei nº 156/98, de 06/06)

<b>Parâmetro analítico</b>	<b>Valor paramétrico</b> (valor à saída da captação – Portaria 1220/2000)	<b>Valor paramétrico</b> (valor após engarrafamento – DL nº 156/98)
Germes totais a 37°C às 24 H	5 ufc / 1 mL de amostra	20 ufc / 1 mL de amostra
Germes totais a 20-22°C às 72 H	20 ufc / 1 mL de amostra	100 ufc / 1 mL de amostra
Coliformes totais	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Escherichia coli</i> ,	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
Enterococos	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Clostridium perfringens</i>	0 ufc / 50 mL de amostra	0 ufc / 50 mL de amostra
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra

**Quadro 3.** Condições a que as águas de nascente devem obedecer (Decreto-Lei nº 306/2007, de 27/08)

Parâmetro analítico	Valor paramétrico (valor à saída da captação – Portaria 1220/2000, de 29/12)	Valor paramétrico (valor após engarrafamento – Decreto-Lei nº 156/98, de 06/06)
<b>Análise bacteriológica</b>		
Germes totais a 37°C às 24 H	5 ufc / 1 mL de amostra	20 ufc / 1 mL de amostra
Germes totais a 20-22°C às 72 H	20 ufc / 1 mL de amostra	100 ufc / 1 mL de amostra
Coliformes totais	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 100 mL de amostra
<i>Escherichia coli</i> ,	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
Enterococos	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<i>Clostridium perfringens</i>	0 ufc / 50 mL de amostra	0 ufc / 100 mL de amostra
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc / 250 mL de amostra	0 ufc / 250 mL de amostra
<b>Análise físico-química</b>		
Turvação	4 UNT	4 UNT
Condutividade eléctrica	2500 µS/cm	2500 µS/cm
pH	- 9,5	- 9,5
Nitratos	50 mg/L	50 mg/L
Nitritos	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Amónia	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Oxidabilidade	5 mg/L	5 mg/L

#### 4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – ALARGAR O ÂMBITO DE ACTUAÇÃO

Como ficou referido, a **vertente epidemiológica** da vigilância sanitária consiste, no caso das águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, na avaliação de

- dados de saúde constantes do Relatório clínico enviado anualmente ao delegado de saúde regional pelo titular do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004),
- dados relativos a situações de doença ocorridas em estabelecimentos termais (de notificação obrigatória ou outras),
- dados recolhidos no âmbito das acções de inspecção e vistoria levadas a efeito pelos serviços de saúde.

Na maior parte dos casos, a monitorização epidemiológica é inexistente ou de difícil interpretação devido a dificuldades relativas à recolha e tratamento de dados epidemiológicos.

Mas no que respeita à vertente epidemiológica, um outro aspecto deve ser realçado em termos de Saúde Pública.

Há evidências de que o **termalismo, como terapêutica adjuvante** ao tratamento de doenças cuja intervenção farmacológica é insuficiente ou está associada a efeitos secundários indesejáveis, está indicado em diversas patologias, nomeadamente: doenças reumáticas e músculo-esqueléticas, respiratórias, dermatológicas, cardiovasculares, nefro-urinárias, digestivas, metabólico-endócrinas, psico-somáticas e neurológicas.

Convém realçar a **necessidade de se desenvolverem estudos de avaliação inequívoca** da eficácia dos tratamentos, de forma a associar as evidências clínicas a constatações científicas, isto é, de forma a “medicalizar” o termalismo.

Os métodos de avaliação da eficácia dos tratamentos termais devem ter em conta o seu cariz multifactorial, sendo que os efeitos das propriedades químicas específicas das águas devem ser associados aos efeitos físicos (calor, radioactividade, lamas, vapores), às técnicas termais utilizadas (massagens, piscina de reabilitação) e, em última análise, aos aquistas a que se destinam.

O impacto na saúde pode então ser reforçado com base em evidências científicas e num leque de ofertas renovadas e novas perspectivas com possibilidades de segmentação, incluindo:

- o **termalismo familiar**, com tratamentos diferenciados para crianças, adultos e idoso,
- o **termalismo de bem-estar** incluindo ofertas de programas anti-stress, anticelulítico, saúde, estética, entre outros,
- o **termalismo preventivo**, cada vez mais associado a uma ideia de prevenção, não como um princípio hipocrático esquecido mas como uma acção fundamental actual.

Salienta-se a actual importância das elevadas incidência e prevalência, não somente de eczemas atópicos, mas de atopias em geral, designadamente nos grupos etários infantil e adolescente cujo tratamento termal tem produzido resultados eficazes mas cuja evidência científica necessita ser realçada.

Assim, devem ser evidenciadas de forma inequívoca as propriedades terapêuticas das águas termais nas afecções para que estão indicadas, contribuindo para:

- credibilizar junto da comunidade científica, em particular na classe médica, e na população em geral este tratamento termal como alternativa sustentada aos tratamentos convencionais, promovendo assim a sua procura,
- desenvolver programas específicos de medicina curativa tendo em conta as características do doente como o sexo, o grupo etário, a gravidade e tempo de evolução da doença, a existência de afecções secundárias entre outras,
- promover e implementar programas de termalismo preventivo numa perspectiva de promoção da saúde e bem-estar a nível individual e familiar.
- promover a utilização das propriedades terapêuticas da água em pediatria, através do desenvolvimento do termalismo infantil.
- justificar a importância da prática termal na redução dos níveis de absentismo escolar e laboral e também nas despesas de saúde.

Assim, os **programas de vigilância sanitária** a desenvolver, durante a época termal, devem incluir uma nova vertente, relacionada com a epidemiologia, acrescentando assim um novo objectivo aos que já foram referidos:

- prevenir as doenças transmitidas pelas águas minerais naturais, através da ingestão, inalação ou contacto dérmico;

- actualizar o diagnóstico da situação no domínio deste tipo de águas, identificando potenciais riscos para a saúde;
- promover a vigilância da qualidade das águas minerais naturais nos estabelecimentos termais;
- **perspectivar a promoção da saúde e bem-estar através do desenvolvimento do termalismo.**

## 5. CONCLUSÕES

A natureza das **águas minerais naturais** como águas de circulação subterrânea profunda, bacteriologicamente próprias e com características físico-químicas estáveis na origem, consignadas na legislação portuguesa como recurso hidromineral cuja exploração industrial se encontra rigorosamente regulamentada no que toca a protecção dos aquíferos, controlo dos processos de produção e do produto acabado, são reconhecidas como águas de excepção.

As **águas de nascente**, também consignadas e regulamentadas por legislação específica, têm origem em aquíferos mais superficiais e são consideradas bacteriologicamente próprias com características físico-químicas que as tornam adequadas para consumo humano no seu estado natural (Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho). Este tipo de águas é submetido, no que respeita a requisitos técnicos, a um processo de qualificação, em tudo análogo ao das águas minerais naturais, antes de começarem a ser exploradas e comercializadas.

As águas minerais naturais e de nascente distinguem-se, entre outros aspectos, pela sua pureza original. Ambas são comercializadas sem qualquer tipo de tratamento, com excepção de tratamentos físicos expressamente autorizados, que não alteram a composição da água nos constituintes essenciais que lhe conferem propriedades próprias.

As águas minerais naturais, pelas suas características físico-químicas e bacteriológicas próprias, considera-se muitas vezes possuírem propriedades terapêuticas com reconhecido valor no tratamento de várias afecções patológicas.

A atribuição de licença de funcionamento a um **estabelecimento termal** requer o cumprimento integral dos requisitos exigidos no Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho, nomeadamente em matéria de instalações, organização e funcionamento, o que, por si só, é uma garantia de funcionamento em condições higio-sanitárias controladas.

De realçar as atribuições, conferidas pelo Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho, aos serviços de saúde em matéria de implementação, inspecção e fiscalização de normas fundamentais à **protecção e promoção da Saúde Pública**.

No que se refere à avaliação da qualidade da água, para além do controlo laboratorial, da competência do titular do estabelecimento termal, previsto na Portaria nº 1220/2000, de 29 de Dezembro, as águas minerais naturais, utilizadas naqueles estabelecimentos, estão também sujeitas ao controlo de qualidade definido anualmente pela Direcção-Geral da Saúde.

Em qualquer dos casos, ao controlo de riscos para a saúde imposto aos titulares de estabelecimentos termais ou de engarrafamento, somam-se as intervenções da **Autoridade de Saúde** no âmbito dos programas de **vigilância sanitária**.

Por tudo isto, as águas minerais naturais e de nascente devem ser consideradas **produtos de alta qualidade** e praticamente isentas de riscos para a saúde decorrentes do seu consumo ou utilização, com propriedades terapêuticas que devem ser evidenciadas de forma inequívoca.

## REFERÊNCIAS

- COREY, O. G., 1988. *Vigilância em epidemiologia ambiental*. México, Metepee: OMS. Vigilância 1
- GRAY, N. F. 1996. In: N.F. Gray - *Drinking Water Quality – Problems and Solutions*. 2<sup>th</sup> edition. Manchester: John Wiley & Sons.
- MENDES, B.; OLIVEIRA J. F. S.2004. *Qualidade da Água para Consumo Humano*. Lisboa: LIDEL, Edições Técnicas, Lda.
- MIGUEL, J. M. P. et al.. 2001. *Monitorização da Saúde Pública*. In: VALORSUL – Valorizar os Resíduos, Monitorizar o Ambiente. Lisboa: VALORSUL, 2001
- RODIER, J. 1996. *Interprétation des résultats analytiques*. In: RODIER, J. - *L'analyse de l'eau – Eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer*. 8<sup>e</sup> edition, Paris: Dunot, pp. 915-1199
- ROBBINS & COTRAN. 2005. *Patologia – Bases Patológicas das Doenças*. 7<sup>a</sup> Edição. Rio de Janeiro: Elsevier.
- TYLER, Jr., C. W. & LAST, J. M., 1998. *Epidemiology*. In: WALLACE, R. B.; DOEBBELLING, B. N., and LAST, J. M., eds – *Public Health & Preventive Medicine*. 14<sup>th</sup> Ed. Connecticut, Stamford: Appleton & Lange.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004. *Guidelines for drinking water quality – Recommendations*, 1. Geneva: WHO.